Este PDF es una versión preliminar. La obra definitiva se encuentra actualmente en proceso de edición

NO COPIAR

Catálogo ilustrativo de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas

Ayda Lilia Enriquez Valencia

Álvaro Caicedo Arana

Eberto Rodríguez Henao

Germán Andrés Aguilera Arango

Dubert Yamil Cañar Serna

NO COPIAR

Colección Transformación del Agro

Palmira -Valle del Cauca, Colombia,

2025

Ficha de catalogación

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Centro de Investigación Palmira. Diagonal a la intersección de la Carrera 36A con Calle 23. Código postal 763531, Colombia.

Esta publicación es resultado del macroproyecto de AGROSAVIA Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura - BGAA.

Colección: Transformación del Agro.

Serie: Libro-catálogo

Fecha de recepción: 30 de enero de 2025

Fecha de evaluación: 30 de febrero de 2025

Fecha de aceptación: 30 de marzo de 2025

Publicado junio de 2025

NO COPIAR

Preparación editorial
Editorial AGROSAVIA
editorial@agrosavia.co
Editora: Liliana Gaona García
Corrección de estilo:
Diagramación:
Impresión:

Citación sugerida: Enriquez Valencia, A. L., Caicedo Arana, A., Rodríguez Henao, E., Aguilera-Arango, G. A., Cañar Serna, D.Y. (2025). *Catálogo ilustrativo de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas.* Mosquera, Colombia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA).

Cláusula de responsabilidad: AGROSAVIA no es responsable de las opiniones y de la información recogida en el presente texto. Los autores asumen de manera exclusiva y plena toda responsabilidad sobre su contenido, ya sea este propio o de terceros, declarando en este último supuesto que cuentan con la debida autorización de terceros para su publicación. Igualmente, expresan que no existe conflicto de interés alguno en relación con los resultados de la investigación propiedad de tales terceros. En consecuencia, los autores serán responsables civil, administrativa o penalmente, frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros, relativa a los derechos de autor u otros derechos que se vulneren como resultado de su contribución.

Línea de atención al cliente: 018000121515

atencionalcliente@agrosavia.co

www.agrosavia.co

https://co.creativecommons.org/?page_id=1

NO COPIAR

Contenido

Agradecimientos....14
Presentación....15
Objetivo....16
Alcance....17
Sugerencias para el buen uso del catálogo....18
Introducción....20
SABA....28
¾ NAINE....29
AMOU ROJO....30
BEND MOSSEDJO....31
BENEDETTA....32
CACHACO COMÚN....33
CACHACO ENANO....34
CACHACO ESPERMO....35
CACHACO SIN BELLOTA....36
CURRARE ENANO....37
DIBY....38
DOMINICO 300....39
DOMINICO ANCUYANO....40
DOMINICO COMUN....41
DOMINICO ENANO....42
DOMINICO GUAICOSO....43
DOMINICO HARTÓN COMÚN....44
DOMINICO HARTÓN ROJO....45
DOMINICO HARTÓN TAMESIS....46
DOMINICO HARTÓN VIOTA....47
DOMINICO MAQUEÑO....48
DOMINICO MOCHO....49
DOMINICO MUTANTE....50
DOMINICO NEGRO....51
DOMINICO TUMACO....52
ELAT....53
FHIA 1....54
FHIA 110....55
FHIA 20....56

NO COPIAR

FHIA 21 57
FHIA 22 58
FHIA 25 59
FIGUE FAMILE 60
GAEP 2 61
HÍBRIDO SABA1 62
HÍBRIDO SABA3 63
HARTÓN COMÚN 64
HARTÓN DEL META 65
HARTÓN HABANO 66
HARTÓN PEPO 67
HARTÓN ROJO 68
HARTÓN TIGRE 69
HARTÓN TÚMACO 70
HONDUREÑO ENANO 71
KELONG MEKINTU 72
KWA 73
LIFONGO LIKO 74
MADRE DEL PLATANAL 75
MAIA MAOLI 76
MAIA MAOLI RISARALDA 77
MANZANO 78
MARITU 79
MBINDI 80
MBOUROUKOU 81
NEY POOVAN 82
NIABANG 83
NJOCK KON 84
ORISHELLE 85
PA 03-22 86
PELIPITA 87
PERRENQUE 88
PISANG CEYLAN 89
POMPO O COMINO 90
PV 0344 91
RED YADE 92
ROSE D´EKONA 93

NO COPIAR

YANGAMBI KM 3 94
BOCADILLO COMÚN 95
BOCADILLO ALTO 96
PISANG MAS 97
PISANG TONGAT 98
PISANG LILIN 99
PALEMBANG 100
TUU GIA 101
NIYARMA YIK 102
ZEBRINA 103
PECIOLOS OSCUROS 104
LONG TAVOY 105
ANNAM 106
GUAYABO ROJO ESPLENDOR 107
PAHANG 108
SELANGOR 1 109
MUSA ROSEA 110
SELANGOR 2 111
MUSA BALBISIANA 112
IC 2 113
FHIA 2 114
FHIA 23 115
SH 3436-9 116
FHIA 17 117
MYSORE 118
SEREDOW 119
GRAN ENANO 120
PIGMEO 121
POYO 122
VALERY 123
DWARF CAVENDISH 124
GROS MICHEL COMÚN 125
GROS MICHEL COCOS 126
GROS MICHEL ENANO 127
SEDA 128
BANANO CHICO 129
BANANO 2 130

NO COPIAR

BOCADILLO CHILENO 131
YANGAMBI KM 5 132
GUINEO NEGRO 133
NAKITENGWA 134
IGITSIRI INTUNTU 135
TAFETAN ROJO 136
TAFETAN VERDE 137
GUAYABO A 138
MUSA TEXTILIS 139
HÍBRIDO SABA 2 140
MUSA BASJOO 141
MAIA MAOLI QUINDIO 142
POMPO O COMINO RISARALDA 143
IITA 144
MUSA LATERITA 145
MUSA ORNATA 146
MUSA VELUTINA 147
MUSA ITINERANS 148
GAEP 1 149
PISANG BERLIN 150
CALCUTTA 4 151
DOMINICO CAOBA 152
AMOU VERDE 153
HARTÓN ROJO DEL META 154
HARTÓN SANTANDER 155
HARTÓN LIBERAL 156
FOUGAMU 157
LA MIEL 158
BOCADILLO DEL CHOCÓ 159
BS269 160
GUAYABO B 161
RED 1 162
RED 2 ENANO 163
HAWAIANO 164
BLANCO 165
MAQUEÑO 166
ANVA 01 167

NO COPIAR

ANVA 02 168
ANVA 03 169
NALLO 04 170
NALLO 05 171
NALLO 06 172
NARI 01 173
NARI 02 174
NATU 07 175
NATU 08 176
NATU 09 177
NATU 10 178
SABO 03 179
SABO 04 180
SABO 01 181
SABO 02 182
SABO 05 183
SAPI 09 184
SARI 10 185
SAPI 08 186
SAVE 06 187
SAVE 07 188
VABU 04 189
VAPA 03 190
VAPA 02 191
VAPA 01 192
VABU 03 193
VABU 02 194
VABU 01 195
ICONONZO 02 196
ICONONZO 03 197
RESTREPO 01 198
GUAYABO RAYADO 199
LIBERAL 200
HARTÓN CUBANO 201
HARTÓN MACHO 202
BANANO INDIO COME SENTAO 203
MATACABALLO 204

NO COPIAR

BANANO ROJO 205
Glosario 207

NO COPIAR

Los autores

Ayda Lilia Enriquez Valencia

Investigadora máster
Red de Frutales
Centro de Investigación Palmira, AGROSAVIA
Correo: aenriquez@agrosavia.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1802-9613

Ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira y Magister en Ciencias Biológicas de la misma universidad. Se ha desempeñado en la conservación y caracterización de Bancos de Germoplasma Vegetal conservados en campo, manejo de equipos de laboratorio de calidad de frutas, técnicas moleculares y administración de los recursos genéticos. Igualmente, en la conservación y mantenimiento agronómico de los Bancos de Germoplasma plantados en campo con énfasis en Guayaba, Guanábana, Cacao, Mango, Musáceas, Coco, Cítricos, Aguacate, Piña, Frutales Tropicales promisorios ubicados en Agrosavia C.I. Palmira.

Álvaro Caicedo Arana

Investigador máster (R)
Red de Frutales
Centro de Investigación Palmira, AGROSAVIA
Correo: acaicedo@agrosavia.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8134-8276

Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, a partir de marzo de 1983. Inició sus actividades de investigación en el año 1986 en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) hasta 1994, fecha en que se reestructura el ICA para dar paso a Corpoica. Entre los años 97 y 98 realizó estudios en la Universidad Politécnica de Valencia España, en donde obtuvo el título de Máster Universitario en Citricultura. Desde entonces ha venido desempeñándose en áreas de investigación relacionadas con la fruticultura con énfasis en citricultura. Entre los años 2014 y 2015 realizó estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, obteniendo el título de Magister en Ciencias Agrarias con línea de profundización en Fruticultura del trópico. Ha participado de la caracterización y evaluación de los recursos genéticos con énfasis

NO COPIAR

en Cítricos, Musáceas, Aguacate, Guayaba, Cacao, Mango, Guanábana, y algunas especies de frutales tropicales promisorios. Lideró los bancos de germoplasma vegetal plantados en campo en el C.I. Palmira y fue responsable como investigador principal IP, de los bancos de germoplasma vegetal en campo.

Eberto Rodríguez Henao

Investigador máster asociado
Red de Frutales
Centro de Investigación Palmira, AGROSAVIA
Correo: erodriguezh@agrosavia.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5795-8864.

Ingeniero agrónomo con maestría en Ciencias Agrarias con línea de investigación en Mejoramiento Genético Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Tiene experiencia en investigación agrícola, conservación de recursos fitogenéticos con énfasis en germoplasma de frutales de clima cálido y programas de fitomejoramiento. Actualmente, lidera el Programa de Mejoramiento Genético de la Guayaba en Agrosavia y participa de actividades de mejoramiento en cultivos de importancia nacional en los sistemas productivos de yuca, mora, batata y banano, en los cuales ha ejecutado proyectos de investigación encaminados al registro de cultivares comerciales, gracias a lo cual se ha logrado el registro de dos variedades de guayaba y dos variedades de yuca. Es el responsable de los Bancos de Germoplasma Vegetal conservados en el Centro de Investigación Palmira de Agrosavia.

Germán Andrés Aguilera-Arango

Correo: german.aguilera@unad.edu.co

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3942-4658.

Biólogo egresado de la Universidad del Valle y Magíster en Ciencias Biológicas con énfasis en Biotecnología Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en investigación y desarrollo de metodologías de propagación vegetal, mediante técnicas convencionales y herramientas biotecnológicas, especialmente cultivo de tejidos vegetales in vitro.

NO COPIAR

Ha trabajado en áreas relacionadas con recursos genéticos vegetales, fitopatología, transferencia de tecnología y extensión rural, con enfoque en sistemas productivos de clima cálido y frío moderado. Su experiencia integra procesos de investigación aplicada, innovación y fortalecimiento de capacidades en el sector agropecuario. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en el Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) Palmira.

Dubert Yamil Cañar Serna

Investigador máster asociado
Red de Cultivos Transitorios y Agroindustriales.
Centro de Investigación Palmira, AGROSAVIA
Correo: dcanar@agrosavia.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8357-1401.

Ingeniero agroindustrial con maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Tiene experiencia en la aplicación de conceptos técnicos y tecnológicos en la transformación industrial de materias primas y aprovechamiento de subproductos del sector agroindustrial; así como en el manejo y uso de herramientas para análisis moleculares, palinológicos y citogenéticos dirigidos a la investigación sostenible de los recursos genéticos. También, se desempeña en el diseño y establecimiento de herramientas virtuales de divulgación agropecuaria destinadas a asistentes técnicos y productores con base en la sistematización de experiencias, y en la implementación de herramientas asociadas a la trazabilidad para la producción de semilla o material de propagación. Coordina el Banco de Germoplasma Vegetal de la Nación Colombiana disponible en campo y materos, en el contexto de la conservación y bioprospección del recurso biológico del país. Actualmente, es investigador máster asociado adscrito a la Red de Cultivos Transitorios y Agroindustriales de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación Palmira.

NO COPIAR

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, por financiar el proyecto "*Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura*", que proporcionó el apoyo financiero para el desarrollo del catálogo.

También, extienden su agradecimiento al Departamento de Agrobiodiversidad de AGROSAVIA por su respaldo en aspectos clave relacionados con el desarrollo administrativo y la ejecución del proyecto de *Bancos de Germoplasma Vegetal Conservados en Campo*, fundamental para la elaboración de este catálogo.

Además, agradecen a Diego Aristizabal Quintero, director del C.I. Palmira y a su equipo de trabajo de las diversas áreas de soporte por su colaboración en los trámites administrativos y logísticos, clave para disponer la colección en condiciones del estudio.

Finalmente, agradecen a los revisores de la revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria de AGROSAVIA, cuyas observaciones y sugerencias permitieron a afianzar los contenidos del manuscrito.

NO COPIAR

Presentación

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) se complace en presentar al lector del *Catálogo ilustrativo de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas*, que se constituye en una herramienta fundamental para investigadores, agricultores, extensionistas, estudiantes y demás interesados en el estudio y la conservación de la variabilidad genética de las musáceas, un grupo que incluye plantas de gran relevancia económica y cultural, como el plátano, banano, bananito y algunas especies ornamentales llegadas a ser consideradas como especies exóticas y otras consideradas como variedades comerciales.

En sus páginas se recopilan las fichas técnicas de las accesiones que forman parte de esta importante colección asociada al proyecto Banco de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura. Cada ficha incluye una descripción detallada del fenotipo o características morfológicas de las accesiones, basada en una serie de descriptores propios de la especie, asociados a planta, tallo, hoja, flor y fruto, producto de la curaduría realizada por un amplio equipo de trabajo de AGROSAVIA en esta colección de germoplasma. Estos descriptores abarcan una amplia gama de atributos, desde la forma y tamaño de las hojas, hasta la apariencia de los frutos, pasando por detalles de las flores y otras partes de la planta, acompañado de un collage de imágenes que facilita su entendimiento.

Además de la descripción morfológica, el catálogo proporciona información relevante e integral de la colección, lo cual facilita la identificación de accesiones con atributos deseables para programas de mejoramiento genético, conservación, transformación agroindustrial, entre otros. Esta variación fenotípica observable permite inferir la importante variabilidad entre genotipos de esta colección vegetal.

Este esfuerzo de documentación y sistematización responde a la misión de AGROSAVIA de promover la investigación y el desarrollo agropecuario en Colombia. *El Catálogo ilustrativo de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas* es un reflejo del compromiso de la institución con la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, aportando valiosa información que puede llegar a ser utilizada en diversos contextos científicos, educativos y productivos en el área de la agroindustria.

NO COPIAR

Invitamos a todos los lectores a explorar este catálogo y a descubrir la riqueza genética de las musáceas en Colombia, contribuyendo así, a la conservación y aprovechamiento sostenible de estos recursos vitales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.

Objetivo

El objetivo del catálogo ilustrativo es describir detalladamente las características morfológicas de la planta, tallo, hoja, flor y fruto de cada una de las accesiones que componen la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas, mediante fichas técnicas claras y accesibles, las cuales proporcionan una guía para identificar y caracterizar las diferentes accesiones bajo las condiciones agroecológicas de AGROSAVIA en su Centro de Investigación (C.I.) Palmira, con el propósito de contribuir a la conservación y mantenimiento de la colección, y promover el aprovechamiento y potencial de uso de los recursos fitogenéticos de la Nación Colombiana.

NO COPIAR

Alcance

El Catálogo ilustrativo de la *Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas* tiene como alcance principal la documentación y descripción íntegra de las características morfológicas de las accesiones incluidas en esta colección, bajo las condiciones agroecológicas del C.I. Palmira de AGROSAVIA, en el Valle del Cauca. El catálogo abarca una amplia gama de individuos y accesiones, proporcionando información detallada sobre aspectos como la morfología de la planta, tallo, hojas, flores y frutos.

Es una herramienta útil para la identificación y diferenciación de las accesiones, facilitando el acceso a información clave para estudios de biodiversidad, conservación, mejoramiento genético, entre otros. También, se proyecta como un material de referencia para conocer la manera de generar aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos genéticos de musáceas en Colombia. Además, el alcance del catálogo incluye la sistematización y normalización de los descriptores morfológicos utilizados, siguiendo estándares internacionales y nacionales para colecciones biológicas. Esto garantiza la coherencia y comparabilidad de la información, no solo dentro del contexto colombiano, sino también en un marco internacional.

A través de esta publicación, AGROSAVIA busca apoyar la preservación de la biodiversidad agrícola del país y contribuir al desarrollo de estrategias para su manejo y utilización a largo plazo de manera sostenible.

NO COPIAR

Sugerencias para el buen uso del catálogo

Las siguientes recomendaciones buscan asegurar que el catálogo sea utilizado de manera efectiva y adecuada, maximizando su valor como herramienta de referencia y conservación para sus lectores:

- *Familiarización con los descriptores morfológicos*: Antes de utilizar el catálogo, se sugiere que el lector se familiarice con los descriptores morfológicos empleados para caracterizar las accesiones. Estos descriptores son fundamentales para entender y comparar las características documentadas en cada ficha técnica.

- *Consulta y comparación de accesiones*: Use el catálogo como una herramienta de consulta para identificar y comparar las diferentes accesiones que conforman la colección. Los lectores pueden utilizar las fichas técnicas para distinguir entre accesiones y especies, basándose en características morfológicas detalladas como la forma de las hojas, tamaño del fruto y características del tallo.

- *Contextualización agroecológica*: Al interpretar la información contenida en el catálogo, es importante considerar las condiciones agroecológicas específicas del Centro de Investigación Palmira de AGROSAVIA. Las características morfológicas pueden variar según las condiciones ambientales donde se encuentra la colección, de esta manera es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se ha evaluado cada accesión.

- *Aplicaciones en investigación y conservación*: Utilice el catálogo como referencia para proyectos de investigación, mejoramiento genético, conservación de recursos fitogenéticos, entre otros ejes temáticos relacionados. La información contenida sirve de base para estudios científicos, desarrollo de estrategias de conservación *in situ* y *ex situ*, y la planificación para la conservación del recurso fitogenético.

- *Actualización y retroalimentación*: Dado que la ciencia y la información genética están en constante evolución, se sugiere a los lectores que estén atentos a nuevas ediciones y actualizaciones del catálogo. Además, se valora la retroalimentación de los usuarios sobre

NO COPIAR

la utilidad y precisión de la información proporcionada, lo cual puede contribuir a mejorar futuras ediciones.

- *Referencias cruzadas y uso de fuentes complementarias*: Para una comprensión integral y precisa, se sugiere consultar otras fuentes complementarias, como publicaciones científicas y bases de datos internacionales, especialmente cuando se trate de estudios comparativos o de transferencia de conocimiento a otros contextos agroecológicos o conservación.

La información transmitida a través de este catálogo permitirá a los lectores ampliar el conocimiento sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de Colombia, específicamente con el germoplasma de musáceas.

NO COPIAR

Introducción

Colombia cuenta con el 14% de la biodiversidad presente en el planeta, siendo considerado como uno de los principales activos del país (Cancino Escalante y Chaparro Giraldo, 2020). Bajo esa premisa, la conservación de la biodiversidad cobra cada día más relevancia, llegando a estar presente incluso en ámbitos políticos, económicos, sociales y científicos (Medina-Robles et al., 2006).

En este sentido, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), que es la entidad líder en la investigación del sector agropecuario del país, tiene entre sus principales funciones la de conservar los recursos genéticos bajo el proyecto denominado Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura, el cual a su vez cuenta con los subsistemas de Microorganismos, Animal y Vegetal, cuyo principal objetivo es preservar la diversidad genética de diferentes especies de interés agropecuario (Valencia et al., 2010). Además de preservar, otra de las principales funciones de los bancos de germoplasma es caracterizar los recursos genéticos, que es requerida para determinar el conjunto de características de una colección para una especie o taxón en particular con la finalidad de diferenciar taxonómicamente las accesiones que lo componen (Caicedo Arana et al., 2023). En otras palabras, lo que se busca con la caracterización es estimar la variabilidad existente en el genoma de la población de individuos que conforman la colección, mediante el uso de descriptores definidos (Hernández-Villarreal, 2013).

De los subsistemas indicados anteriormente, llama la atención el subsistema Vegetal, debido a que cuenta con más de treinta y cuatro mil accesiones de especies de interés agrícola, de las cuales cerca de treinta mil son conservadas por semilla e *in vitro*, mientras que las restantes se encuentran en campo, distribuidas en nueve sedes o centros de investigación ubicados en las principales zonas agrícolas del territorio nacional (Cerón et al., 2021). De estas sedes, el Centro de Investigación Palmira es reconocido a nivel nacional por conservar en campo algunas de las colecciones de germoplasma de frutales más importantes del país, entre los que se encuentra la colección de musáceas.

Dada la importancia de los recursos genéticos como herramienta frente a la escasez de alimentos y en pro de salvaguardar la variabilidad de las especies cultivadas en riesgo de erosión, es necesario preservarlos en colecciones de germoplasma (FAO, 2021). En el mundo, la fuente más rica de diversidad de musáceas se encuentra en el Centro Internacional de distribución de germoplasma

NO COPIAR

(ITC), ubicado en Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en Bélgica, creada como un sistema de respaldo de seguridad, formado a través de donaciones de los bancos, programas de mejoramiento genético y por medio de expediciones de recolección de germoplasma del INIBAP (Red internacional para el mejoramiento del banano y el plátano), el cual alberga más de 1500 accesiones de especies comestibles y silvestres (Alliance Bioversity & Centro Internacional de Agricultura Tropical [CIAT], 2020). Igualmente, el Sistema de Información de Germoplasma de Musáceas (MGIS), registra las colecciones o bancos de germoplasma alrededor del mundo, el cual además recopila y comparte públicamente la información disponible sobre las accesiones de estas colecciones (Ruas et al., 2017).

Por su parte, AGROSAVIA en su misión institucional, se encarga de administrar la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas, la cual tiene como propósito conservar el germoplasma bajo tres principios: valor de existencia, valor de opción y valor de uso; y para cumplir con ellos, se plantea difundir información importante sobre la diversidad genética conservada en ella. Esta importante colección hace parte del proyecto Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura (BGAA) de la República de Colombia, los cuales son administrados por AGROSAVIA bajo el marco del decreto 1470 del 2018 el Gobierno Nacional, donde asigna la función de administración del BGAA al MADR, y mediante la resolución 327 de 2018 el MADR delega la administración de BGAA a AGROSAVIA como entidad con las competencias técnico-científicas para tal labor. Cabe desatacar que se cuentan con diferentes estudios de caracterización para la identificación de materiales sobresalientes como los resultados de Enriquez-Valencia et al. (2023), donde resaltaron el color de la pulpa como un atributo sensorial que mejor define la calidad de un alimento, realizando la caracterización por colorimetría de 25 accesiones de plátano (*Musa balbisiana*), clasificándolas entre amarillo tenues e intensos. Así mismo, Caicedo (2015), reporta la caracterización morfológica, físico-química y nutricional para las accesiones de bananos, plátanos, bananitos y especies ornamentales relacionadas, mediante descriptores establecidos por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI por su sigla en inglés), la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP por su sigla en francés) y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD por su sigla en francés) (IPGRI-INIBAP/CIRAD, 1996). Igualmente, en 2025 Aguilera et al. realizaron una revisión detallada de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas donde se

NO COPIAR

describe el proceso histórico de la conformación de esta colección en Colombia, así como su proceso de conservación y estrategia de uso de esta.

Teniendo en cuenta la gran variabilidad existente de esta familia en las diferentes zonas productivas del territorio nacional, AGROSAVIA en su Centro de Investigación Palmira ha hecho un gran esfuerzo por reunir, preservar y caracterizar parte del recurso genético de este grupo taxonómico en la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas y sus especies relacionadas, el cual cuenta con 197 accesiones conservadas en campo. En ese sentido, la caracterización morfológica de esta colección, complementada con la evaluación y análisis de las características fisicoquímicas y de calidad, facilitará y orientará la necesidad de colectar germoplasma, ayudará a definir la eliminación de germoplasma redundante en la colección, mediante la identificación de accesiones duplicadas y permitirá la selección de materiales sobresalientes en futuros programas de mejoramiento. En este contexto, el objetivo del catálogo ilustrativo fue describir las características morfológicas de la planta, tallo, hoja, flor y fruto de cada una de las accesiones que componen la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas, bajo las condiciones agroecológicas del Centro de Investigación Palmira de AGROSAVIA, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Con esta guía, los lectores podrán identificar fácilmente las características y diferencias entre las accesiones e individuos de la colección, con el propósito final, de preservar la identidad de la colección y apoyar estrategias que promuevan su potencial de uso.

Para la toma de las variables morfológicos de la colección de musáceas, se tomó como base los descriptores del IPGRI-INIBAP/CIRAD (1996), los cuales, para facilidad del lector, se presenta continuación las figuras e información adicional que sirven de guía al lector en el estudio de cada una de las variables implementadas en este catálogo por cada órgano evaluado:

Variables del psesudotallo

- Altura. Se mide en centímetros desde la base del pseudotallo hasta el punto de emergencia del racimo.
- Pigmentación. Se observa en las vainas, las más extremas: 1. Sin color, 2. Marrón/rojizo-marrón, 3. Negro, 4 Otro (especificar cual).
- Color subyacente del pseudotallo. Se debe quitar la vaina externa y observar la superficie del pseudotallo. Los valores 5 (rosado-malva), 6 (rojo-violáceo) y 7 (morado) se deben elegir sólo si se trata de una pigmentación uniforme que no permite ver un color verde o

NO COPIAR

crema: 1. Verde agua, 2. Verde claro, 3. Verde, 4. Crema, 5. Rosado malva, 6. Rojo violáceo, 7. Morado, 8. Otro (especificar cual).

- Cera en las vainas del pseudotallo: 1. Muy poca o sin signos visibles de cera, 2. Poca cera, 3. Cerosa, 4. Muy cerosa.

Variables de las hojas

- Canal del pecíolo de la hoja III (La hoja III es la tercera hoja contando a partir de la última hoja desarrollada antes de la emergencia del gajo. Se debe cortar el pecíolo en el medio entre el pseudotallo y el limbo y examinar la sección transversal: 1. Abierto con márgenes alados, 2. Abierto con márgenes erectos, 3. Estrecho con márgenes erectos, 4. Márgenes retorcidos hacia el interior, 5. Márgenes superpuestos (figura 1).




Figura 1. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: canal del peciolo de la hoja III.

- Manchas en la base del pecíolo: 1. Pocas, 2. Manchas pequeñas, 3. Manchas grandes, 4. Pigmentación extensa, 5. Ninguna pigmentación.
- Presencia de cera en la lámina. Se debe observar la cara inferior de la lámina: 1. Muy poca o sin signos visibles de cera, 2. Poca cera, 3. Cerosa, 4. Muy cerosa.
- Color de los márgenes del pecíolo: 1. Verde, 2. Rosado malva a rojo, 3. Morado a azul, 4. Otro (especificar cual).
- Hábito foliar: 1. Erecto, 2. Normal, 3. Decumbente, 4. Otro (especificar cual) (figura 2).




Figura 2. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: habito foliar.

Variables de la inflorescencia

Forma de la yema masculina. Fijarse en el aspecto general de la yema masculina a la cosecha: 1. En forma de trompo, 2. Lanceolada, 3. Intermedia, 4. Ovoide, 5 Redondeada (figura 3).




Figura 3. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: forma de la yema masculina.

- Color de la cara interna de la bráctea: 1. Blancuzco, 2. Amarillo o verde, 3. Anaranjado rojo, 4. Rojo, 5. Morado, 6. Violeta café, 7. Rosado malva, 8. Otro (especificar cual).
- Coloración atenuada de la base de la bráctea. Se debe observada en el interior de la bráctea: 1. Coloración discontinua hacia la inserción con el raquis (zona depigmentada al nivel de la base de la bráctea), 2. Coloración homogénea (la pigmentación es uniforme y continua hasta la base).
- Comportamiento de las brácteas antes de caer: 1. Revoluto (se enrolla), 2. No revoluto (no se enrolla) (figura 4).




Figura 4. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: comportamiento de las brácteas antes de caer.

- Color básico de los tépalos compuestos. No se debe tener en cuenta la pigmentación de los lóbulos: 1. Blanco, 2. Crema, 3. Amarillo, 4. Anaranjado, 5. Rosado/rosado malva, 6. Otro (especificar cual).
- Color de los lóbulos del tépalo compuesto: 1. Crema, 2. Amarillo, 3. Anaranjado, 4. Verde, 5. Otro (especificar cual).
- Imbricación de las brácteas. Se debe observar el alineamiento de las brácteas en el ápice de la yema masculina: 1. Brácteas viejas cubren el ápice (como *Musa acuminata* subsp. *malaccensis*), 2. Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren, 3 Brácteas jóvenes lo cubren claramente (como *Musa acuminata* subsp. *burmanicca*).

Variables del racimo

- Posición del racimo (Posición de la parte fructífera). Hace referencia al ángulo entre la posición vertical y el eje general del racimo: 1. Pendular verticalmente, 2. Ligeramente inclinado, 3. Oblicuo a 45°, 4. Horizontal, 5. Erecto.
- Forma del racimo: 1. Cilíndrico, 2. Cono truncado, 3. Asimétrico - el eje del racimo es casi recto, 4. Con una curva en el eje del racimo, 5. En forma de espiral (todos los frutos del racimo son insertados en una sola espiral a lo largo del raquis).
- Posición del raquis: 1. Pendular verticalmente, 2. Inclinado, 3. Con una curva, 4. Horizontal, 5. Erecto (figura 5).

NO COPIAR




Figura 5. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: posición del raquis.

- Aspecto del raquis: 1. Desnudo, 2. Flores neutras (en una o pocas manos, el raquis está desnudo después), 3. Flores masculinas o brácteas persistentes encima de la yema masculina (el raquis está desnudo encima), 4. Flores neutras o masculinas y presencia de brácteas apinceladas (en todo el raquis), 5. Flores neutras o masculinas en todo el raquis, sin brácteas persistentes, 6. Pequeño racimo de flores neutras/hermafroditas justo encima de la yema masculina, 7. Otro (especificar cual).
- Cicatrices sobre el raquis. Se debe observar después de la caída de brácteas y flores: 1. Bien prominentes, 2. Poco prominentes.
- Pubescencia del pedúnculo: 1. Glabro, 2. Poco pubescente, 3. Muy pubescente/pelos cortos (como tocar terciopelo), 4. Muy pubescente/pelos largos (> 2 mm).

Variables del fruto

- Ápice del fruto. Se observa en el extremo distal del fruto: 1. Puntiagudo, 2. Largamente puntiagudo, 3. Truncado, 4. En cuello de botella, 5. Redondeado (figura 6).




Figura 6. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: ápice del fruto.

- Vestigios florales en el ápice del fruto. Se observa en el extremo distal del fruto: 1. Sin vestigios florales, 2. Estilo persistente, 3. Base del estilo prominente (figura 7).

NO COPIAR




Figura 7. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: vestigios florales en el ápice del fruto.

- Forma de los frutos (Curva longitudinal): 1. Rectos (ó con curva poco marcada), 2 Rectos en la parte distal, 3. Curvos (una curva muy marcada), 4. Curvos en S (doble curva), 5. Otro (especificar cual) (figura 8).




Figura 8. Imágenes de referencia para las categorías de la variable: Forma de los frutos (Curva longitudinal).

NO PIAR

SABA

Código Único Interno (CUI): 1301 0001

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Desconocido **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** Desconocido

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,19 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien Prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,4 ± 0,5

Número de frutos por mano: 16,8 ± 4,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 16,01 ± 3,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

¾ NAINE

Código Único Interno (CUI): 1301 0002

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,52 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,3 ± 0,6

Número de frutos por mano: 6,3 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 32,01 ± 5,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

AMOU_ROJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0003

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Quindío **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,10 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Blancuzco

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabros

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,8

Número de frutos por mano: 10,3 ± 0,7

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 26,67 ± 1,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BEND MOSSEDJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0004

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,20 ±0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,5

Número de frutos por mano: 10,0 ± 0,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 34,51 ± 1,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BENEDETTA

Código Único Interno (CUI): 1301 0005

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Saba **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,11 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Muy cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 10,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 22,51 ± 1,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

CACHACO COMÚN

Código Único Interno (CUI): 1301 0006

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Bluggoe **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,76 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,5 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 18,8 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base Prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 38,91 ± 3,1

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

CACHACO ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0007

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Bluggoe **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,50 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 4,8 ± 1,1 **Número de frutos por mano:** 11,2 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 24,81 ± 3,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

CACHACO ESPERMO

Código Único Interno (CUI): 1301 0008

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Bluggoe **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,63 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento de bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco Prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 4,5 ± 0,6 **Número de frutos por mano:** 12,3 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 30,57 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

CACHACO SIN BELLOTA

Código Único Interno (CUI): 1301 0009

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Bluggoe **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,65 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabros

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,2 **Número de frutos por mano:** 12,6 ± 1,7

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo Persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 37,33 ± 7,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

CURRARE ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0010

DATOS DE PASAPORTE

País: Costa Rica **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,20 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento de bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,8 ± 1,6

Número de frutos por mano: 12,8 ± 1,1

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 33,05 ± 5,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DIBY

Código Único Interno (CUI): 1301 0011

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,28 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 1,4

Número de frutos por mano: 12,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 16,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO 300

Código Único Interno (CUI): 1301 0012

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 4,15 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,9

Número de frutos por mano: 19,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 51,01 ± 4,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO ANCUYANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0013

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,13 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 2,1

Número de frutos por mano: 12,5 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 24,51 ± 4,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO COMUN

Código Único Interno (CUI): 1301 0014

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,40 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,3 ± 1,9

Número de frutos por mano: 15,2 ± 2,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 27,01 ± 3,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0015

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,70 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 10,0 ± 0.5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 30,01 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO GUAICOSO

Código Único Interno (CUI): 1301 0016

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,05 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,5

Número de frutos por mano: 12,0 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 40,91 ± 4,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO HARTÓN COMÚN

Código Único Interno (CUI): 1301 0017

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,05 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,3 ± 1,5

Número de frutos por mano: 9,7 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 56,61 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO HARTÓN ROJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0018

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,20 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 9,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 12,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 41,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO_HARTÓN_TAMESIS

Código Único Interno (CUI): 1301 0019

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS_MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,68 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 1,3

Número de frutos por mano: 10,5 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 36,01 ± 8,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO_HARTÓN_VIOTA

Código Único Interno (CUI): 1301 0020

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS_MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,65 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,4

Número de frutos por mano: 12,0 ± 4,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 42,61 ± 2,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO MAQUEÑO

Código Único Interno (CUI): 1301 0021

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,82 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,0

Número de frutos por mano: 13,7 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 32,21 ± 6,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO MOCHO

Código Único Interno (CUI): 1301 0022

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,76 ± 0,6

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,7 ± 0,6

Número de frutos por mano: 12,3 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 50,01 ± 5,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO MUTANTE

Código Único Interno (CUI): 1301 0023

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** No reportado **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,55 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 13,0 ± 1,2

Número de frutos por mano: 16,0 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 34,01 ± 8,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO NEGRO

Código Único Interno (CUI): 1301 0024

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,00 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,4

Número de frutos por mano: 14,0 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 44,01 ± 2,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

DOMINICO TUMACO

Código Único Interno (CUI): 1301 0025

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 4,15 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,2

Número de frutos por mano: 13,0 ± 0,6

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 55,01 ± 4,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ELAT

Código Único Interno (CUI): 1301 0026

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,30 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Verde

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 20,0 ± 0,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,21 ± 3,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 1

Código Único Interno (CUI): 1301 0027

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,49 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 9,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 14,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 25,33 ± 5,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 110

Código Único Interno (CUI): 1301 0028

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,58 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente. lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,8 **Número de frutos por mano:** 13,5 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 30,33 ± 5,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 20

Código Único Interno (CUI): 1301 0029

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,58 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 13,7 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 38,01 ± 7,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 21

Código Único Interno (CUI): 1301 0030

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,49 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,3 ± 0,6 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 30,51 ± 4,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 22

Código Único Interno (CUI): 1301 0031

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,55 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Con curva

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,7 ± 0,5

Número de frutos por mano: 13,5 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 39,01 ± 2,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 25

Código Único Interno (CUI): 1301 0032

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,91 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,6 ± 3,8

Número de frutos por mano: 14,8 ± 5,2

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 14,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FIGUE FAMILE

Código Único Interno (CUI): 1301 0033

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Pome **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,91 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,6 ± 1,1

Número de frutos por mano: 11,8 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 15,01 ± 0,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

GAEP 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0035

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AABB

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,98 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 8,8 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 14,5 ± 2,6

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

HÍBRIDO SABA1

Código Único Interno (CUI): 1301 0036

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AABB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,46 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde oscuro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 2,1 **Número de frutos por mano:** 13,0 ± 4,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 6,01 ± 0,3

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

HÍBRIDO SABA3

Código Único Interno (CUI): 1301 0037

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,88 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Morada

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,4 ± 1,9

Número de frutos por mano: 13,3 ± 2,2

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 8,01 ± 1,7

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

HARTÓN COMÚN

Código Único Interno (CUI): 1301 0039

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,00 ± 0,7 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde oscuro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 5,7 ± 0,9 **Número de frutos por mano:** 6,3 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 52,01 ± 2,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN DEL META

Código Único Interno (CUI): 1301 0040

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Meta **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,25 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 9,0 ± 0,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 54,01 ± 2,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN HABANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0041

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,90 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,7 ± 2,3

Número de frutos por mano: 6,3 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 16,01 ± 0,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN PEPO

Código Único Interno (CUI): 1301 0043

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Boyacá **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,12 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Oblicuo a 45º **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 4,3 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 3,8 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 54,67 ± 7,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN ROJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0044

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,20 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,8 **Número de frutos por mano:** 7,3 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 38,85 ± 0,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN TIGRE

Código Único Interno (CUI): 1301 0045

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,47 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,5 ± 2,1

Número de frutos por mano: 4,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 31,01 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN TÚMACO

Código Único Interno (CUI): 1301 0046

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,45 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,7 ± 2,4

Número de frutos por mano: 6,3 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 20,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HONDUREÑO ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0047

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,84 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 1,4

Número de frutos por mano: 5,5 ± 0,7

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 25,01 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

KELONG MEKINTU

Código Único Interno (CUI): 1301 0048

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 250 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,7 ± 0,6

Número de frutos por mano: 10,7 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 41,21 ± 2,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

KWA

Código Único Interno (CUI): 1301 0049

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,95 ± 1,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 2,1 **Número de frutos por mano:** 11,5 ± 4,9

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 40,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

LIFONGO LIKO

Código Único Interno (CUI): 1301 0050

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,97 ± 0,8

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 9,0 ± 0,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 43,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MADRE DEL PLATANAL

Código Único Interno (CUI): 1301 0051

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,71 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poco cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,5 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 2,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 52,01 ± 2,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MAIA MAOLI

Código Único Interno (CUI): 1301 0052

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Popoulu **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,38 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde oscuro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 7,3 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 13,0 ± 1,4

Fruto

Ápice del fruto: Redondeado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,01 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MAIA MAOLI RISARALDA

Código Único Interno (CUI): 1301 0053

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Popoulu **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,50 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,6 ± 1,3

Número de frutos por mano: 4,0 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Redondeado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 26,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MANZANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0054

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,59 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,3 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 11,0 ± 2,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 20,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MARITU

Código Único Interno (CUI): 1301 0055

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Iholena **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,88 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 12,5 ± 1,7 **Número de frutos por mano:** 22,3 ± 4,8

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 26,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MBINDI

Código Único Interno (CUI): 1301 0056

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,78 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,2 ± 1,1

Número de frutos por mano: 14,2 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 12,01 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MBOUROUKOU

Código Único Interno (CUI): 1301 0057

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,85 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,2 ± 0,8

Número de frutos por mano: 7,4 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 38,91 ± 1,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NEY POOVAN

Código Único Interno (CUI): 1301 0059

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AB

Subgrupo: Ney poovan **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,88 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 9,0 ± 0,7

Número de frutos por mano: 13,4 ± 0,9

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 21,75 ± 5,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NIABANG

Código Único Interno (CUI): 1301 0060

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,95 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 16,0 ± 0,9

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 55,01 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NJOCK KON

Código Único Interno (CUI): 1301 0061

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,48 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,3 ± 0,9

Número de frutos por mano: 14,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 56,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ORISHELLE

Código Único Interno (CUI): 1301 0062

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,55 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,5

Número de frutos por mano: 12,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 39 ± 1,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PA 03-22
Código Único Interno (CUI): 1301 0063

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,55 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Roja

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,8 ± 0,4 **Número de frutos por mano:** 16,0 ± 4,6

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PELIPITA

Código Único Interno (CUI): 1301 0064

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Pelipita **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,10 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Morada

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,8 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 12,3 ± 3,9

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 37,67 ± 2,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PERRENQUE

Código Único Interno (CUI): 1301 0065

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Pelipita **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,16 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Morada

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 2,4 **Número de frutos por mano:** 11,3 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 33,67 ± 7,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PISANG CEYLAN

Código Único Interno (CUI): 1301 0066

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Mysore **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,95 ± 0,7

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Asimétrico

Posición del raquis: Horizontal

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,3 ± 2,5

Número de frutos por mano: 17,3 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 13,01 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

POMPO O COMINO

Código Único Interno (CUI): 1301 0068

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Popoulu **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,25 ± 0,6 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 14,0 ± 1,6

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 29,01 ± 1,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PV 0344
Código Único Interno (CUI): 1301 0069

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,75 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,5 ± 1,3 **Número de frutos por mano:** 16,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,13 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

RED YADE

Código Único Interno (CUI): 1301 0070

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,15 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Muy cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 15,0 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 45,01 ± 2,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ROSE D´ EKONA

Código Único Interno (CUI): 1301 0071

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,97 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,8 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 1,6

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 36,51 ± 7,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

YANGAMBI KM 3

Código Único Interno (CUI): 1301 0072

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Silk **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,27 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,4 ± 0,9 **Número de frutos por mano:** 15,0 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,67 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BOCADILLO COMÚN

Código Único Interno (CUI): 1301 0073

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,38 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Crema

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,4 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 19,2 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,41 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BOCADILLO ALTO

Código Único Interno (CUI): 1301 0074

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,60 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 7,0 ± 2,6 **Número de frutos por mano:** 16,8 ± 4,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 12,41 ± 2,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PISANG MAS

Código Único Interno (CUI): 1301 0075

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,55 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,2 ± 1,3 **Número de frutos por mano:** 18,6 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,77 ± 3,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PISANG TONGAT

Código Único Interno (CUI): 1301 0076

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,40 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Morado a azul

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Horizontal

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 10,2 ± 1,3

Número de frutos por mano: 16,3 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 5,01 ± 0,3

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

PISANG LILIN

Código Único Interno (CUI): 1301 0077

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,23 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Horizontal **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 12,2 ± 0,8 **Número de frutos por mano:** 13,2 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,75 ± 1,8

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

PALEMBANG

Código Único Interno (CUI): 1301 0078

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,86 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Morado

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,5 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 15,5 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 18,01 ± 1,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

TUU GIA

Código Único Interno (CUI): 1301 0079

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,15 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 11,0 ± 1,4

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,53 ± 2,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NIYARMA_YIK

Código Único Interno (CUI): 1301 0080

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,08 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, sin brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 6,3 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 11,5 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,21 ± 1,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ZEBRINA

Código Único Interno (CUI): 1301 0081

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,36 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,3 ± 1,5

Número de frutos por mano: 15,2 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 8,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PECIOLOS OSCUROS

Código Único Interno (CUI): 1301 0082

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,03 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 13,8 ± 1,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 9,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

LONG TAVOY

Código Único Interno (CUI): 1301 0083

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Burmannica **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,14 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Inclinado

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 12,0 ± 0,5

Número de frutos por mano: 10,0 ± 1,7

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 10,71 ± 0,5

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

ANNAM

Código Único Interno (CUI): 1301 0084

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Burmannica **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,29 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 10,0 ± 2,5 **Número de frutos por mano:** 13,0 ± 0,5

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,31 ± 1,2

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

GUAYABO ROJO ESPLENDOR

Código Único Interno (CUI): 1301 0085

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,85 ± 0,6 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Morado a azul

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,2 **Número de frutos por mano:** 19,0 ± 0,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 23,01 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

PAHANG

Código Único Interno (CUI): 1301 0086

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Malaccensis **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,45 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 10,5 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 21,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SELANGOR 1

Código Único Interno (CUI): 1301 0087

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Malaccensis **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,73 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Horizontal **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 10,2 ± 1,5 **Número de frutos por mano:** 11,3 ± 1,1

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,01 ± 0,6

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

MUSA ROSEA

Código Único Interno (CUI): 1301 0088

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Siamea **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,86 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Con curva

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 4,8 ± 1,3

Número de frutos por mano: 15,2 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 7,71 ± 0,4

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

SELANGOR 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0089

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Zebrina **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,88 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Horizontal

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,5 ± 1,8

Número de frutos por mano: 14,8 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 9,51 ± 1,1

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

MUSA BALBISIANA

Código Único Interno (CUI): 1301 0091

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** BB

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,45 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabros

Número de manos por racimo: 15,5 ± 2,5

Número de frutos por mano: 13,5 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 20,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

IC 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0092

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,85 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,0

Número de frutos por mano: 15,7 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 21,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

FHIA 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0093

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAA

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,65 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,2 ± 1,1 **Número de frutos por mano:** 13,8 ± 2,5

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm)**: 9,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

FHIA 23

Código Único Interno (CUI): 1301 0094

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAA

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,32 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,0 ± 2,6

Número de frutos por mano: 14,3 ± 2,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 16,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

SH 3436-9
Código Único Interno (CUI): 1301 0095

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAA

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,30 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 7,7 ± 1,5 **Número de frutos por mano:** 13,3 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,01 ± 0,5

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

FHIA 17

Código Único Interno (CUI): 1301 0096

DATOS DE PASAPORTE

País: Honduras **Departamento:** Cortés **Municipio:** San Pedro Sula

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAAA

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,75 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Muy cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Morado a azul

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,0 ± 2,8 **Número de frutos por mano:** 13,5 ± 4,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 24,8 ± 4,5

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

MYSORE

Código Único Interno (CUI): 1301 0097

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,40 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,6 **Número de frutos por mano:** 16,3 ± 3,3

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,33 ± 1,5

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

SEREDOW

Código Único Interno (CUI): 1301 0099

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,88 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 8,3 ± 1,5

Número de frutos por mano: 16,8 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 18,01 ± 3,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

GRAN ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0100

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,53 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 13,5 ± 2,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 17,01 ± 3,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

PIGMEO

Código Único Interno (CUI): 1301 0101

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,45 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Muy cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Morado

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,6 ± 1,1 **Número de frutos por mano:** 13,2 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 15,41 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

POYO

Código Único Interno (CUI): 1301 0102

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,24 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,4 **Número de frutos por mano:** 15,8 ± 0,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,61 ± 1,8

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

VALERY

Código Único Interno (CUI): 1301 0103

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,83 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente Lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 7,6 ± 0,9 **Número de frutos por mano:** 15,8 ± 4,8

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,01 ± 0,5

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

DWARF CAVENDISH

Código Único Interno (CUI): 1301 0105

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Cavendish **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 243 ± 0,8 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 7,8 ± 1,3 **Número de frutos por mano:** 19,5 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Esti

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,01 ± 0,7

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

GROS MICHEL COMÚN

Código Único Interno (CUI): 1301 0106

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,8 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 7,5 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 14,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,81 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

GROS MICHEL COCOS

Código Único Interno (CUI): 1301 0107

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,45 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Inclinado

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,5 ± 1,3

Número de frutos por mano: 16,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 20,51 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

GROS MICHEL ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0108

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,99 ± 0,6

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,0 ± 4,2

Número de frutos por mano: 13,0 ± 7,1

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 18,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

SEDA

Código Único Interno (CUI): 1301 0109

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 248 ± 30,7

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón/rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: En forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 8,3 ± 2,4

Número de frutos por mano: 17,3 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos en S

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 11,41 ± 0,8

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

BANANO CHICO

Código Único Interno (CUI): 1301 0110

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,15 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 8,7 ± 1,2 **Número de frutos por mano:** 17,3 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

BANANO 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0111

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,55 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,8 ± 1,3

Número de frutos por mano: 15,4 ± 3,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 10,01 ± 0,3

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

BOCADILLO CHILENO

Código Único Interno (CUI): 1301 0112

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,87 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,8 ± 0,4

Número de frutos por mano: 14,0 ± 2,7

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 13,31 ± 1,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

YANGAMBI KM 5

Código Único Interno (CUI): 1301 0113

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Ibota **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,32 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Oblicuo a 45° **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 17,5 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,01 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

GUINEO NEGRO

Código Único Interno (CUI): 1301 0114

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Lujugira/Mutika **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,03 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,6 ± 1,0

Número de frutos por mano: 14,9 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 20,45 ± 3,6

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

NAKITENGWA

Código Único Interno (CUI): 1301 0115

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Lujugira/Mutika **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,61 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 4,5 ± 0,7

Número de frutos por mano: 10,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 16,61 ± 4,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

IGITSIRI INTUNTU

Código Único Interno (CUI): 1301 0116

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Lujugira/Mutika **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,85 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Blancuzco

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Crema

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Inclinado

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 8,0 ± 1,5

Número de frutos por mano: 20,0 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 8,01 ± 0,4

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

TAFETAN ROJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0117

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Red **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,30 ± 0,6

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 5,7 ± 1,5

Número de frutos por mano: 15,7 ± 2,6

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 26,7 ± 1,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

TAFETAN VERDE

Código Único Interno (CUI): 1301 0118

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Red **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,01 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,8 **Número de frutos por mano:** 12,8 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,51 ± 1,9

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

GUAYABO_A

Código Único Interno (CUI): 1301 0119

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Red **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,98 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 4,2

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

MUSA TEXTILIS

Código Único Interno (CUI): 1301 0120

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Australimusa **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Australimusa

Subgrupo: Australimusa **Especie:** *Musa textilis*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 250 ± 1,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** No cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Amarillo o Verde

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal **Forma:** Con curva

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 2,1 **Número de frutos por mano:** 16,0 ± 3,5

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 12,5 ± 3,2

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

HÍBRIDO SABA 2

Código Único Interno (CUI): 1301 0121

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AB

Subgrupo: Híbrido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,57 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,1 ± 0,9

Número de frutos por mano: 13,4 ± 1,8

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 9,51 ± 1,8

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

MUSA BASJOO

Código Único Interno (CUI): 1301 0122

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Eumusa

Subgrupo: Eumusa **Especie:** *Musa basjoo*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,01 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Redondeada

Color de la cara interna de la bráctea: Amarilla-Verde

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Anaranjado

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,3 ± 1,5

Número de frutos por mano: 16,6 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 11,75 ± 2,6

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

MAIA MAOLI QUINDIO

Código Único Interno (CUI): 1301 0123

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Popoulu **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,13 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Asimétrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,3 ± 1,5

Número de frutos por mano: 5,0 ± 1,4

Fruto

Ápice del fruto: Redondeado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 26,33 ± 5,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

POMPO O COMINO RISARALDA

Código Único Interno (CUI): 1301 0124

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Risaralda **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Popoulu **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,25 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 11,0 ± 0,9 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 41,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

IITA

Código Único Interno (CUI): 1301 0125

DATOS DE PASAPORTE

País: Nigeria **Departamento:** Oyo **Municipio:** Ibadán

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,40 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Blanco

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 10,0 ± 3,2

Número de frutos por mano: 20,0 ± 1,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 13,01 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

MUSA_LATERITA

Código Único Interno (CUI): 1301 0126

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: _http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx

CLASIFICACIÓN

Sección: Rhodochlamys **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Rhodochlamys

Subgrupo: Rhodochlamys **Especie:** *Musa laterita*

CARACTERÍSTICAS_MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,35 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lig lo cubren

Racimo

Posición: Erecto **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Erecto **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 4,3 ± 1,2 **Número de frutos por mano:** 6,5 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 5,55 ± 1,1

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

MUSA ORNATA

Código Único Interno (CUI): 1301 0127

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Rhodochlamys **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Rhodochlamys

Subgrupo: Rhodochlamys **Especie:** *Musa ornata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 0,96 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Ninguna

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Anaranjado

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Erecto

Forma: Asimétrico

Posición del raquis: Erecto

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 8,2 ± 0,9

Número de frutos por mano: 11,5 ± 2,4

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 5,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

MUSA VELUTINA

Código Único Interno (CUI): 1301 0128

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Rhodochlamys **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Rhodochlamys

Subgrupo: Rhodochlamys **Especie:** *Musa velutina*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 0,87 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: estrecho con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Anaranjado

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Erecto

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Erecto

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos largos

Número de manos por racimo: 4,3 ± 1,2

Número de frutos por mano: 5,3 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 4,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

MUSA ITINERANS

Código Único Interno (CUI): 1301 0129

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Rhodochlamys **Tipo:** Ornamental **Genoma:** Rhodochlamys

Subgrupo: Rhodochlamys **Especie:** *Musa itinerans*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,92 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Amarillo-Verde

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Crema

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 8,2 ± 1,6

Número de frutos por mano: 12,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 14,61 ± 2,2

Presencia de semillas: Abundante semilla

NO COPIAR

GAEP 1

Código Único Interno (CUI): 1301 0130

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AB

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,98 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,7 ± 2,6

Número de frutos por mano: 8,8 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 19,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Poca semilla

NO COPIAR

PISANG BERLIN

Código Único Interno (CUI): 1301 0131

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,82 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Redondeada

Color de la cara interna de la bráctea: Morado

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,4

Número de frutos por mano: 13,5 ± 3,4

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 12,5 ± 1,6

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

CALCUTTA 4

Código Único Interno (CUI): 1301 0132

DATOS DE PASAPORTE

País: Bélgica **Departamento:** Brabante Flamenco **Municipio:** Lovaina

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AA

Subgrupo: Burmanica **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 1,8 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Crema **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Morado a Azul

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Horizontal **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 10,3 ± 3,2 **Número de frutos por mano:** 20,5 ± 2,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 4,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

DOMINICO CAOBA

Código Único Interno (CUI): 1301 0134

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,74 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 12,0 ± 0,6

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 37,76 ± 8,4

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

AMOU_VERDE

Código Único Interno (CUI): 1301 0135

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Dominico **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,86 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poco cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,5

Número de frutos por mano: 12,0 ± 0,3

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 32,33 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN ROJO DEL META

Código Único Interno (CUI): 1301 0136

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Meta **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,69± 0,6 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón/rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** No cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos hacia el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Asimétrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,7 ± 0,6 **Número de frutos por mano:** 6,3 ± 3,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 25,01 ± 1,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN SANTANDER

Código Único Interno (CUI): 1301 0137

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,36 ± 0.3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos hacia el interior

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,2

Número de frutos por mano: 10,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 33,01 ± 1,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN LIBERAL

Código Único Interno (CUI): 1301 0138

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,00 ± 0.5

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos en interior

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Oblicuo a 45°

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Pequeño racimo de FN/H

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 14,0 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Base prominente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 34,01 ± 1,7

Presencia de semillas: Sin semilla

NO COPIAR

FOUGAMU

Código Único Interno (CUI): 1301 0139

DATOS DE PASAPORTE

País: Francia **Departamento:** Hérault **Municipio:** Montpellier

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** ABB

Subgrupo: Pisang Awak **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,92 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 11,0 ± 0,9 **Número de frutos por mano:** 16,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 34,01 ± 8,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

LA MIEL

Código Único Interno (CUI): 1301 0140

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Caldas **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,38 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 8,0 ± 0,4

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 20,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BOCADILLO DEL CHOCÓ

Código Único Interno (CUI): 1301 0141

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Chocó **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,40 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,3 ± 0,6 **Número de frutos por mano:** 19,0 ± 1,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,41 ± 0,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BS269

Código Único Interno (CUI): 1301 0142

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,68 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,3

Número de frutos por mano: 12,0 ± 0,6

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 21,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Pocas semillas

NO COPIAR

GUAYABO_B

Código Único Interno (CUI): 1301 0143

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Gros Michel **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,10 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 14,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,31 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

RED 1

Código Único Interno (CUI): 1301 0144

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,00 ± 1,6

Pigmentación en el pseudotallo: Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide

Color de la cara interna de la bráctea: Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Erecto

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,7 ± 1,2

Número de frutos por mano: 11,7 ± 4,0

Fruto

Ápice del fruto: Truncado

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 9,8 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

RED 2 ENANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0145

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,40 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Morado

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 4,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 12,0 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 22,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HAWAIANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0146

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 3,10 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Decumbentes

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,2 **Número de frutos por mano:** 11,5 ± 3,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 15,33 ± 2,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BLANCO

Código Único Interno (CUI): 1301 0147

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,58 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,5 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 9,0 ± 1,4

Fruto

Ápice del fruto: Ligeramente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 24,33 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MAQUEÑO

Código Único Interno (CUI): 1301 0148

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (m): 2,82 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón/rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Estrecho con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Asimétrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 14,0 ± 1,2

Fruto

Ápice del fruto: Cuello de botella **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 30,51 ± 2,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ANVA_01

Código Único Interno (CUI): 1301 0149

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Valdivia

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,50 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,0 ± 2,0 **Número de frutos por mano:** 17,4 ± 5,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 17,51 ± 1,5

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ANVA_02

Código Único Interno (CUI): 1301 0150

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Valdivia

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 1,75 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 18,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 18,91 ± 0,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ANVA_03

Código Único Interno (CUI): 1301 0151

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Valdivia

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,45 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 6,5 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 20,0 ± 0,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,01 ± 0,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NALLO 04

Código Único Interno (CUI): 1301 0152

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Llorente

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,68 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 8,0 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 21,5 ± 0,7

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,35 ± 3,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NALLO 05

Código Único Interno (CUI): 1301 0153

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Llorente

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,43 ± 0,3

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón/rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: No cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Ausentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,5 ± 1,9

Número de frutos por mano: 17,8 ± 2,2

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 17,75 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NALLO 06

Código Único Interno (CUI): 1301 0154

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Llorente

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 1,68 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Muy cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,0 ± 2,8 **Número de frutos por mano:** 19,0 ± 11,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,87 ± 3,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NARI 01

Código Único Interno (CUI): 1301 0155

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Ricaurte

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,35 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 17,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 17,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NARI 02

Código Único Interno (CUI): 1301 0156

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Ricaurte

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,48 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,0 ± 2,8 **Número de frutos por mano:** 15,5 ± 6,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,45 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NATU 07

Código Único Interno (CUI): 1301 0158

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 3,20 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Blancuzco

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Naranja

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 1,9 **Número de frutos por mano:** 17,5 ± 2,6

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,01 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NATU 08

Código Único Interno (CUI): 1301 0159

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,65 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,0 ± 1,8 **Número de frutos por mano:** 16,8 ± 3,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,88 ± 3,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NATU 09

Código Único Interno (CUI): 1301 0160

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,73 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 7,0 ± 1,4 **Número de frutos por mano:** 20,5 ± 3,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,01 ± 2,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NATU 10

Código Único Interno (CUI): 1301 0161

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Nariño **Municipio:** Tumaco

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,55 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Ausente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,6 ± 2,5 **Número de frutos por mano:** 18,2 ± 5,2

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 21,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SABO 03

Código Único Interno (CUI): 1301 0162

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Bolívar

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,37 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Asimétrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 19,0 ± 1,7

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 10,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SABO 04

Código Único Interno (CUI): 1301 0163

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Bolívar

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,68 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,5 ± 2,1 **Número de frutos por mano:** 19,5 ± 3,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,33 ± 4,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SABO 01

Código Único Interno (CUI): 1301 0164

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Bolívar

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,70 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,2 **Número de frutos por mano:** 21,0 ± 1,5

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,01 ± 0,6

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SABO 02

Código Único Interno (CUI): 1301 0165

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Bolívar

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,43 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,0 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 20,0 ± 4,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,25 ± 1,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SABO 05

Código Único Interno (CUI): 1301 0166

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Bolívar

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,49 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Intermedia **Color de la cara interna de la bráctea:** Violeta café

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 5,3 ± 1,2 **Número de frutos por mano:** 17,3 ± 4,0

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 19,01 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SAPI 09

Código Único Interno (CUI): 1301 0167

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Piedecuesta

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,50 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,8 ± 0,8 **Número de frutos por mano:** 17,2 ± 3,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,51 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SARI 10

Código Único Interno (CUI): 1301 0168

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Piedecuesta

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,63 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 3,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 13,5 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 17,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SAPI 08

Código Único Interno (CUI): 1301 0169

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Piedecuesta

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,10 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,3 **Número de frutos por mano:** 20,0 ± 0,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,41 ± 2,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SAVE 06

Código Único Interno (CUI): 1301 0170

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Vélez

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,55 ± 0,5

Pigmentación en el pseudotallo: Brillante

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo

Cera en las vainas del pseudotallo: No cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: No cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo

Color de la cara interna de la bráctea: Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescente

Número de manos por racimo: 5,0 ± 1,4

Número de frutos por mano: 14,5 ± 4,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 13,01 ± 0,7

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

SAVE 07

Código Único Interno (CUI): 1301 0171

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Santander **Municipio:** Vélez

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,55 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,4 **Número de frutos por mano:** 22,0 ± 0,8

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 13,01 ± 2,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VABU 04

Código Único Interno (CUI): 1301 0172

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buga

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,30 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores masculinas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 5,8 ± 0,5 **Número de frutos por mano:** 18,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 23,51 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VAPA 03

Código Único Interno (CUI): 1301 0173

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,13 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 4,5 ± 3,5 **Número de frutos por mano:** 15,0 ± 9,9

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 16,71 ± 1,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VAPA 02

Código Único Interno (CUI): 1301 0174

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,33 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,2 **Número de frutos por mano:** 17,0 ± 1,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 12,51 ± 2,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VAPA_01

Código Único Interno (CUI): 1301 0175

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,50 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,3 ± 1,0 **Número de frutos por mano:** 18,8 ± 2,4

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,75 ± 3,2

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VABU 03

Código Único Interno (CUI): 1301 0176

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buga

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,30 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Asimétrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 5,5 ± 0,7 **Número de frutos por mano:** 17,0 ± 2,8

Fruto

Ápice del fruto: ligeramente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 15,71 ± 0,8

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VABU 02

Código Único Interno (CUI): 1301 0177

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buga

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,50 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Rosado malva

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 20,5 ± 0,7

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 17,01 ± 0,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

VABU 01

Código Único Interno (CUI): 1301 0178

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buga

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,35 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Forma de trompo **Color de la cara interna de la bráctea:** Blancuzco

Color atenuado de la base de la bráctea: homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,0 ± 0,1 **Número de frutos por mano:** 15,0 ± 1,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,01 ± 1,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ICONONZO 02

Código Único Interno (CUI): 1301 0180

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,46 ± 0,1

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva

Cera en las vainas del pseudotallo: Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Grandes

Presencia de cera en la lámina: Sin cera

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Con curva

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Ausente

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,7 ± 1,2

Número de frutos por mano: 20,7 ± 3,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 14,01 ± 0,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

ICONONZO 03

Código Único Interno (CUI): 1301 0181

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,50 ± 0,2 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rosado malva **Cera en las vainas del pseudotallo:** Sin cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Extensas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Erecto

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Inclinado **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 6,3 ± 0,6 **Número de frutos por mano:** 20,0 ± 2,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 14,87 ± 3,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

RESTREPO_01

Código Único Interno (CUI): 1301 0182

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Restrepo

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Bananito **Genoma:** AA

Subgrupo: Sucrier **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,68 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Sin cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada **Color de la cara interna de la bráctea:** Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Inclinado **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 7,0 ± 2,8 **Número de frutos por mano:** 19,0 ± 4,2

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 11,67 ± 2,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

GUAYABO_RAYADO

Código Único Interno (CUI): 1301 0183

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS_MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 3,40 ± 0,4

Pigmentación en el pseudotallo: Sin color

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Lanceolada

Color de la cara interna de la bráctea: Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea

Comportamiento bráctea antes de caer: Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Rosado malva

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular

Forma: Cono truncado

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Poco pubescentes

Número de manos por racimo: 9,7 ± 1,9

Número de frutos por mano: 12,8 ± 2,3

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Sin vestigios

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 48,01 ± 2,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

LIBERAL

Código Único Interno (CUI): 1301 0184

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,98 ± 0,7 **Pigmentación en el pseudotallo:** Morado

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Márgenes retorcidos hacia el interior **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Amarillo **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo.

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras o masculinas con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 6,7 ± 2,3 **Número de frutos por mano:** 12,8 ± 2,4

Fruto

Ápice del fruto: Ligeramente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Base prominente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 28,93 ± 2,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN CUBANO

Código Único Interno (CUI): 1301 0185

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,55 ± 0,2

Pigmentación en el pseudotallo: Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro

Cera en las vainas del pseudotallo: Cerosa

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos

Manchas en la base del peciolo: Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa

Color de las márgenes del peciolo: Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente

Color de la cara interna de la bráctea: Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente

Comportamiento bráctea antes de caer: Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente

Color de los lóbulos del tépalo compuesto: Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado

Forma: Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular

Aspecto del raquis: FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes

Pubescencia del pedúnculo: Glabro

Número de manos por racimo: 5,6 ± 1,5

Número de frutos por mano: 5,2 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo

Vestigios florales en ápice del fruto: Estilo persistente

Forma de los frutos: Curvos

Longitud del pedicelo del fruto (mm): 38,01 ± 1,9

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

HARTÓN MACHO

Código Único Interno (CUI): 1301 0186

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Plátano **Genoma:** AAB

Subgrupo: Plantain Hartón **Especie:** *Musa balbisiana*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,37 ± 0,3 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde agua **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes erectos **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Poca cera **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ausente **Color de la cara interna de la bráctea:** Ausente

Color atenuado de la base de la bráctea: Ausente **Comportamiento bráctea antes de caer:** Ausente

Color básico de los tépalos compuestos: Ausente **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Ausente

Imbricación de las brácteas: Ausente

Racimo

Posición: Ligeramente inclinado **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Poco prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Glabro

Número de manos por racimo: 7,0 ± 0,2 **Número de frutos por mano:** 6,0 ± 0,5

Fruto

Ápice del fruto: Largamente puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 20,01 ± 1,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BANANO INDIO COME SENTAO

Código Único Interno (CUI): 1301 0187

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** AAA

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 1,92 ± 0,4 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón - Rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Verde claro **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Muy cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Decumbente

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Naranja - Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** No revoluto **Color básico de los tépalos compuestos:** Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente Lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cilíndrico

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** FN o M, con brácteas

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos cortos

Número de manos por racimo: 9,0 ± 0,4 **Número de frutos por mano:** 18,0 ± 2,1

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 15,0 ± 3,4

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

MATACABALLO

Código Único Interno (CUI): 1301 0188

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 2,07 ± 0,5 **Pigmentación en el pseudotallo:** Marrón/rojizo

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pequeñas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Verde

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Discontinua **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Con curva **Aspecto del raquis:** Desnudo

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominente **Pubescencia del pedúnculo:** Poco pubescente

Número de manos por racimo: 7,5 ± 1,8 **Número de frutos por mano:** 10,3 ± 3,5

Fruto

Ápice del fruto: Truncado **Vestigios florales en ápice del fruto:** Sin vestigios

Forma de los frutos: Rectos en la parte distal **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 12,31 ± 0,3

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

BANANO ROJO

Código Único Interno (CUI): 1301 0189

DATOS DE PASAPORTE

País: Colombia **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** No reportado

Datos complementarios: **http://bgvcolombia.agrosavia.co:8026/gringlobal/search.aspx**

CLASIFICACIÓN

Sección: Eumusa **Tipo:** Banano **Genoma:** Desconocido

Subgrupo: Desconocido **Especie:** *Musa acuminata*

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Pseudotallo

Altura (cm): 3,05 ± 0,1 **Pigmentación en el pseudotallo:** Negro

Color subyacente del pseudotallo: Rojo violáceo **Cera en las vainas del pseudotallo:** Poca cera

Hojas

Canal del peciolo de la hoja III: Abierto con márgenes alados **Manchas en la base del peciolo:** Pocas

Presencia de cera en la lámina: Cerosa **Color de las márgenes del peciolo:** Rosado malva

Habito foliar: Normal

Inflorescencia

Forma de la yema masculina: Ovoide **Color de la cara interna de la bráctea:** Rojo

Color atenuado de la base de la bráctea: Homogénea **Comportamiento bráctea antes de caer:** Revoluto

Color básico de los tépalos compuestos: Crema **Color de los lóbulos del tépalo compuesto:** Amarillo

Imbricación de las brácteas: Brácteas viejas cubren el ápice

Racimo

Posición: Pendular **Forma:** Cono truncado

Posición del raquis: Pendular **Aspecto del raquis:** Flores neutras

Cicatrices sobre el raquis: Bien prominentes **Pubescencia del pedúnculo:** Pelos largos

Número de manos por racimo: 10,2 ± 2,5 **Número de frutos por mano:** 15,3 ± 2,0

Fruto

Ápice del fruto: Puntiagudo **Vestigios florales en ápice del fruto:** Estilo persistente

Forma de los frutos: Rectos **Longitud del pedicelo del fruto (mm):** 15,65 ± 0,1

Presencia de semillas: Sin semillas

NO COPIAR

NO COPIAR

Glosario

Para los fines de este catálogo, se adoptan los siguientes términos, basados en las definiciones de varios autores relacionados con el grupo de especies vegetales en estudio. Estos términos se incluyen con el propósito de complementar y facilitar la comprensión del contenido del documento:

Accesión: Muestra de semillas diferenciable e identificable de manera única, que representa un cultivar, una línea de mejoramiento o una población, y que se mantiene en almacenamiento para conservación y uso (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2024a).

Agrobiodiversidad: La variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos que se utilizan directa o indirectamente para la alimentación y la agricultura, incluidos los cultivos, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Comprende la diversidad de recursos genéticos (variedades, razas) y especies utilizadas como alimento, forraje, fibra, combustible y productos farmacéuticos. También incluye la diversidad de especies no cosechadas que sustentan la producción (microorganismos del suelo, depredadores, polinizadores) y aquellas del entorno más amplio que sustentan los agroecosistemas (agrícolas, pastoriles, forestales y acuáticos), así como la diversidad de los agroecosistemas. (FAO, 1999).

Banco de Germoplasma: Centro para la conservación de los recursos genéticos en condiciones que permiten prolongarles la vida. (Kameswara et al., 2007).

Características morfológicas: son cualidades, propiedades o atributos medibles de los organismos que tengan "diferencias" con al menos otro organismo de la misma taxonomía. Las diferencias pueden ser presencia/ausencia del atributo o la presencia del atributo con diferentes estados en diferentes organismos (RAE, 2024).

Colección: Grupo de accesiones de germoplasma que se mantienen en determinadas condiciones y con un propósito definido (Kameswara, 2007).

NO COPIAR

Colecciones biológicas: Las colecciones biológicas son conjuntos de organismos, o partes de ellos, organizados de modo a proveer informaciones acerca de la procedencia, colecta e identificación de cada uno de sus especímenes (Fundação Oswaldo Cruz [Fiocruz], 2024).

Curaduría: Conjunto de conocimientos y técnicas dirigidos a la conservación, supervisión y exhibición de bienes (Real Academia Española [RAE], 2024).

Conservación: Es el campo de estudio y acción que trata del manejo del paisaje, de tal manera que: 1) a corto plazo se minimicen o neutralicen los efectos negativos de los seres humanos sobre la naturaleza, la cual los incluye y 2) a largo plazo provea a los otros seres vivos del máximo número de alternativas para tolerar y sobrevivir a la especie humana. (Feinsinger, 2004).

Datos de pasaporte: Información básica sobre el origen de una accesión, que incluye datos como el sitio donde se colectó, el pedigrí u otra información relevante que ayude a identificarla (Kameswara, 2007).

Diversidad: Biodiversidad, o diversidad biológica, se refiere a la variedad de vida en la tierra. Hay tres niveles de organización biológica - genética, especies y ecosistema - que se reflejan en una descripción de la diversidad biológica en tres niveles jerárquicos ampliamente utilizados" (FAO, 2024b; Kameswara, 2007).

Documentación: Colección organizada de registros que describen la estructura, el propósito, el funcionamiento, el mantenimiento y los requerimientos de datos (Kameswara, 2007).

Especies exóticas: Una especie exótica es cualquier especie animal, vegetal o de otro reino biológico que ha sido introducida fuera de su área de distribución natural, es decir, que no es nativa o autóctona del hábitat en el que se encuentra. También se la conoce como "especie introducida", "especie no nativa", "especie foránea" o "especie alóctona" (Solano, 2023).

Fenotipo: Apariencia externa de una planta que resulta de la interacción de su composición genética (genotipo) con el medio ambiente (Kameswara, 2007).

Fitomejoramiento: Se refiere a las actividades destinadas a la transferencia de genes, combinación de genes y/o variabilidad genética desde materiales iniciales inadaptados

NO COPIAR

hacia materiales de mejoramiento de más fácil utilización, los cuales podrán servir más adelante como parentales en programas de fitomejoramiento. Se pueden identificar dos métodos distintos: (A) por introgresión de las características genéticas deseadas en el pool genético de materiales de élite adaptados. Este es el método más común para la potenciación genética, utilizado por ejemplo en la transferencia de los principales genes de resistencia a enfermedades. La introgresión puede lograrse por medio de cruzamientos repetidos (backcrossing) o utilizando técnicas de biotecnología. (B) Por incorporación o ampliación de la base genética, que consiste en el desarrollo a gran escala de poblaciones adaptadas a las condiciones locales a partir de germoplasma que no ha sido mejorado, a través de un proceso a largo plazo orientado hacia las poblaciones. Este último es un método generalmente menos utilizado para la potenciación genética (FAO, 2024a).

Genotipo: Constitución genética de una planta u organismo (Kameswara, 2007).

Germoplasma: Término utilizado para describir recursos genéticos vivos, como semillas o tejidos, mantenidos con fines de reproducción, preservación y otros usos de investigación porque contiene información sobre la composición genética de una especie, un valioso recurso natural de diversidad vegetal (FAO, 2024b).

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA): Cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. (FAO, 2024).

Seguridad alimentaria: Situación que se da cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Con arreglo a esta definición, pueden determinarse cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico a los mismos, utilización de los alimentos y estabilidad a lo largo del tiempo (FAO, 2024b).

Trazabilidad: Proceso que permite identificar una especie vegetal desde la producción de la semilla hasta la adquisición de los productos vegetales terminados por parte del consumidor final, incluida la producción de la semilla, la trasformación, procesamiento,

NO COPIAR

transporte, distribución y comercialización, y demás información asociada a todos los eslabones de la cadena productiva. (MADR 931, 2018).

Variedad: Plantas cultivadas que se diferencian de las demás de su especie por sus características morfológicas, fisiológicas, citológicas, químicas u otras significativas para la agricultura y que al ser reproducida conserva sus características. (ICA 3180, 2009).

NO COPIAR

Bibliografía

Alliance Bioversity & CIAT. (2020). *International Musa Germplasm Transit Centre*. https://alliancebioversityciat.org/services/genebanks/international-musa-germplasm-transit-centre

Caicedo Arana, Á. (2015). *Caracterización y evaluación morfológica, física y química de introducciones del banco de germoplasma de musáceas en el Centro de Investigación Corpoica Palmira*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira]. Repositorio UN. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58986

Caicedo Arana, A., Enríquez Valencia, A. L., Rodríguez Henao, E., Aguilera-Arango, G. A., Montero Cantillo, Y. D., Arenas-Rubio, I., Moreno Pérez, S., Castro Pérez, E. A., Gutiérrez-Berdugo, I. A, & Cañar Serna, D. Y. (2023). *Descriptores para guayaba (Psidium spp.) con guía ilustrada y catálogo técnico*. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia). https://doi.org/10.21930/agrosavia.manual.7406115

Cancino Escalante, G., & Chaparro Giraldo, A. (2020). Estado de la investigación científica y el acceso a los recursos genéticos por grupos de investigación colombianos. *Revista Colombiana de Biotecnología*, *22*(1), 70-78. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v22n1.79451

Cerón, I., Reyes, P. H. & Martínez, F. E. (2021). Banco de Germoplasma Vegetal de la Nación Colombiana (BGV). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12324/36723.

Enriquez Valencia, A. L., Lucas-Aguirre, J. C., Caicedo-Arana, Á., Rodríguez-Henao, E., Aguilera-Arango, G. A., Cañar-Serna, D. Y., & Ocampo, J. A. (2023). Evaluación fisicoquímica y funcional de harinas y almidones del germoplasma de *Musa* spp. en Colombia. *Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences*, *39*(1): 107-120. https://doi.org 10.29393/CHJAA39-9EFAJ70009

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (1999). *¿Qué es la agrobiodiversidad?* FAO. http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e01.htm

NO COPIAR

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2022). *Banana Statistical Compendium 2021*. FAO. https://www.fao.org/3/cc2401en/cc2401en.pdf

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024a). *WIEWS - El Sistema Mundial de Información y Alerta Rápida sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Glosario*. FAO. http://www.fao.org/wiews/glossary/es/

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024b). Agrovoc. FAO. https://www.fao.org/agrovoc/es/search

Feinsinger, P. (2004). El diseño de estudios de Campo para la conservación de la Biodiversidad. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Editorial FAN.

Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. *Colecciones Biológicas.* Fiocruz. https://portal.fiocruz.br/es/colecciones-biologicas#:~:text=Las%20colecciones%20biol%C3%B3gicas%20son%20conjuntos,cada%20uno%20de%20sus%20espec%C3%ADmenes.

Aguilera-Arango G.A., Enriquez-Valencia A.L., Rodríguez-Henao E., Valencia-Montoya J.A., Tibaduiza-Castañeda L.T., Cañar Serna D.Y. 2025. Genetic resources of Musaceae in Colombia, a review of their use and conservation. **Tropical and Subtropical Agroecosystems**, [S.l.], v. 28, n. 3, sep. 2025. ISSN 1870-0462. Available at: <https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/5958>. Date accessed: 14 oct. 2025. doi:http://dx.doi.org/10.56369/tsaes.5958.

Hernández-Villareal, A. E. (2013). Caracterización morfológica de recursos fitogenéticos. *Revista Bio Ciencias, 2*(3): 113-118. https://doi.org/10.15741/revbio.02.03.05

ICA. Instituto Colombiano Agropecuario. Resolución 3180 (26, agosto 2009). "Por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para la producción y distribución de material de propagación de frutales en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones". Diario oficial. Bogotá, 2009. No. 47458. 11 p.

IPGRI-INIBAP/CIRAD. (1996). Descriptores para el banano (*Musa* spp.). Instituto International de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia; Red International para el Mejoramiento de1

NO COPIAR

Banano y el Platano, Montpellier, Francis; y el Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpement, Montpellier, Francis.

Kameswara-Rao, N., Hanson, J., Ehsan-Dulloo, M., Ghosh, K., Nowelly, D., Larin-De, y.m. (2007). *Manual para el manejo de semillas en bancos de germoplasma. Manuales para bancos de germoplasma*. Biodiversity international.

MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Decreto 931 "Por el cual se crea el Sistema de Trazabilidad Vegetal y se incluye como título 11 de la parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Único Reglamento del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural". 28 de marzo de 2018.

Medina-Robles, V. M., Velasco-Santamaría, Y. M., Cruz-Casallas, P. E. (2006). Los bancos de recursos genéticos y su papel en la conservación de la biodiversidad. *Orinoquia, 10*(1): 71-77. https://doi.org/10.22579/20112629.205

RAE. Real Academia Española, (2024). *Definición resiembra.* RAE. https://dle.rae.es/resiembra

RAE. Real Academia Española, (2024). *Definición curaduría.* RAE. Diccionario de ecología: Paisajes, conservación y desarrollo sustentable para Latinoamérica. Sarmiento, F. O. (2000). https://dle.rae.es/curadur%C3%ADa

Ruas, M., Guignon, V., Sempere, G., Sardos, J., Hueber, Y., Duvergey, H., Andrieu, A., Chase, R., Jenny, C., Hazekamp, T., Irish, B., Jelali, K., Adeka, J., Ayala-Silva, T., Chao, C.P., Daniells, J., Dowiya, B., Effa-Effa, B., Gueco, L., Herradura, L., Ibobondji, L., Kempenaers, E., Kilangi, J., Muhangi, S., Ngo Xuan, P., Paofa, J., Pavis, C., Thiemele, D., Tossou, C., Sandoval, J., Sutanto, A., Vangu Paka, G., Yi, G., Van den houwe, I., Roux, N., Ruard, M. (2017) MGIS: managing banana (Musa spp.) genetic resources information and high-throughput genotyping data. *Database: The Journal of Biological Databases and Curation*, 2017:bax046. https://doi.org/10.1093/database/bax046

Solano, Jessica (19 de abril de 2023). *Especie exótica*. Enciclopedia Concepto. https://concepto.de/especie-exotica/

Valencia, R. A., Lobo Arias, M., & Ligarreto, G. A. (2010). Estado del arte de los recursos genéticos vegetales en Colombia: Sistema de Bancos de Germoplasma. *Ciencia Y*

NO COPIAR

Tecnología Agropecuaria, *11*(1), 85–94. https://doi.org/10.21930/rcta.vol11_num1_art:198

NO COPIAR

Portadilla

Este catálogo ilustrativo reúne una descripción detallada de las características morfológicas de las accesiones que forman parte de la Colección Colombiana de Germoplasma de Musáceas, gestionada bajo las condiciones agroecológicas específicas del Centro de Investigación Palmira de La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA, ubicado en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca. El documento se presenta como una herramienta esencial para el estudio, conservación y aprovechamiento de la diversidad genética de musáceas, un grupo de plantas que incluye especies de gran importancia económica y cultural, como el plátano y el banano.

El catálogo se organiza en fichas técnicas que describen aspectos morfológicos clave de cada accesión, incluyendo la planta, el tallo, las hojas, las flores y los frutos. Cada ficha técnica está acompañada de imágenes ilustrativas que facilitan la identificación visual de las características descritas. Este catálogo no solo sirve como una referencia académica para investigadores y estudiantes, sino como una herramienta práctica para agricultores y profesionales del sector agrícola. Cabe destacar, que la información contenida puede ser utilizada para estudios sobre biodiversidad, agrobiodiversidad, taxonomía y mejoramiento genético de musáceas, entre otros ejes temáticos relacionados. También, es útil para la conservación de recursos genéticos, ayudando en la implementación de estrategias de conservación *in situ* y *ex situ*. Además, puede ser empleado en la agricultura y el desarrollo económico, proporcionando información relevante para la selección de accesiones que permita la generación de nuevos cultivos y mejorar los existentes, permitiendo promover el uso sostenible y eficiente de los recursos fitogenéticos disponibles. Es importante señalar que la colección de musáceas, al igual que las demás que forman parte del proyecto BGAA, está disponible para el público a través de un Acuerdo de Transferencia de Material Vegetal (ATM). Las solicitudes se pueden enviar al correo recursosbiologicos@agrosavia.co. Finalmente, El desarrollo del presente catálogo ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto de investigadores, profesionales, operarios y demás colaboradores dedicados a la conservación y estudio de las musáceas en Colombia.

NO COPIAR