



El campo
es de todos

Minagricultura


Precauciones y recomendaciones

- Agite el producto antes de usar.
- Nunca suministre una cantidad mayor a la recomendada.
- Administre el producto utilizando una jeringa por animal.
- Evite que el producto se quede en la boca del ternero, ya que podría generar películas adheridas a las encías con posibilidades de generación de abscesos y caries.
- Nunca mezcle Rumitec® con otros biológicos o compuestos de naturaleza química.
- Lávese las manos antes de suministrar el producto, utilice siempre jeringas dosificadoras limpias y desechables, sin agujas.
- Para lograr un mayor efecto de Rumitec®, es recomendable un adecuado manejo nutricional del ternero, acompañado de buenas prácticas ganaderas.

Rumitec®

Único probiótico con microorganismos de razas criollas colombianas

¿Cuál es la cantidad recomendada de Rumitec®?



AGROSAVIA

Corporación colombiana de investigación agropecuaria



Si conoce su campo!

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
AGROSAVIA - sede Central
Centro de Investigación Tibaitatá
Kilómetro 14 vía Mosquera-Bogotá, Mosquera, código postal 250047,
Colombia.

Martha Isabel Gómez Álvarez

Directora de Vinculación (E), sede Central
Correo: mgomez@agrosavia.co

Fernando Rodríguez Villamizar

Investigador asociado, Red de Ganadería y Especies Menores,
Centro de Investigación Tibaitatá
Correo: frodriguez@corpoica.org.co

Claudia Patricia Buitrago Albarado

Profesional de Apoyo a la Investigación,
Departamento de Transferencia de Tecnología, sede Central
Correo: cpbuitrago@agrosavia.co

Diana Marcela León Moreno

Profesional de Seguimiento, Departamento de Desarrollo
de Negocios, sede Central
Correo: dmleon@agrosavia.co

Erika Andrea Alarcón Torres

Profesional de Seguimiento, Departamento de Desarrollo
de Negocios, sede Central
Correo: ealarcon@agrosavia.co

Magda Lucía Sierra Moreno

Analista de Mercados, Departamento de Propiedad Intelectual,
sede Central
Correo: msierra@agrosavia.co

Nota: A partir de mayo de 2018, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria cambió su acrónimo Corpoica por AGROSAVIA.

Cláusula de responsabilidad

AGROSAVIA no es responsable de las opiniones e información recogidas en el presente texto. Los autores asumen de manera exclusiva y plena toda responsabilidad sobre su contenido, ya sea este propio o de terceros, declarando en este último supuesto que cuentan con la debida autorización de terceros para su publicación; igualmente, declaran que no existe conflicto de interés alguno en relación con los resultados de la investigación propiedad de tales terceros. En consecuencia, los autores serán responsables civil, administrativa o penalmente, frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros relativa a los derechos de autor u otros derechos que se hubieran vulnerado como resultado de su contribución.

Rumitec® es un probiótico a base de bacterias benéficas que contiene mínimo 100 millones de UFC (unidades formadoras de colonia) por mililitro y mejora la absorción de nutrientes en terneras y terneros en etapa de iniciación. Se emplea para acelerar el desarrollo del rumen y potencializar el rendimiento productivo del ternero; el equilibrio de la flora intestinal; y la aceleración del paso de lactante a rumiante.

Los beneficios

El probiótico Rumitec® acelera el destete, ahorra el consumo de leche en terneros, genera mayor ganancia de peso en la etapa de iniciación y, como un beneficio extra, previene diarreas.



Cantidad recomendada

El probiótico Rumitec® debe ser administrado por vía oral a terneros en etapa de iniciación, en una dosis de 10 mL, durante 10 días consecutivos, a partir del tercer día de nacido. La dosis se repite a los 5 y a los 15 días después de la última administración.

¿Cómo lo debe usar?

- Sujete al animal y llévelo al brete o lugar para inmovilizarlo.
- Agite el frasco de Rumitec®, inserte la jeringa dosificadora en el tapón perforado sin retirarlo del frasco y tome 10 mL del contenido del frasco.
- Administre Rumitec® por el lado derecho de la boca del ternero y vierta el producto hacia lo profundo de la garganta, evitando una posible broncoaspiración.
- Cierre el frasco herméticamente hasta la siguiente aplicación.